УДК 616-056.52:616.34:579.262

Оригинальная статья

<https://doi.org/10.21886/2219-8075-2025-16-3-67-74>

Возможные маркеры ожирения, связанные с микробиомом кишечника

Л.А. Ганенко¹, Н.И. Волкова¹, А.В. Шестопалов², Ю.Л. Набока¹, А.Л. Зибарев¹

¹Ростовский государственный медицинский университет, Ростов-на-Дону, Россия

²Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д.Рогачева, Москва, Россия

Автор, ответственный за переписку: Ганенко Лилия Александровна, ganenko.lilia@yandex.ru.

Аннотация. Цель: изучить особенности содержания некоторых видов микроорганизмов в толстой кишке методом метагеномного секвенирования у пациентов с ожирением и у здоровых людей с нормальной массой тела. **Материалы и методы:** обследованы 265 человек (44 мужчин и 221 женщина, средний возраст — 47,1 ± 4,8 года). Сформированы две клинические группы: здоровые с нормальной массой тела (n = 129) и пациенты с ожирением (n = 136). Оценка состава микробиома кишечника выполнена путём метагеномного анализа. Из образцов кала выделяли ДНК и проводили секвенирование переменного участка v3–v4 гена 16S рРНК. **Результаты:** выявлены статистически значимые (p < 0,05) различия количественных и качественных показателей некоторых видов микроорганизмов в толстой кишке у здоровых людей без ожирения и у пациентов с ожирением. У пациентов с ожирением повышено количество *P. copri*. и снижено количество *F. prausnitzii*, *B. adolescentis* и *B. longum*. **Выводы:** полученные результаты продемонстрировали определённые видовые различия в микробиоме кишечника у здоровых лиц и у пациентов с ожирением.

Ключевые слова: ожирение, микробиом кишечника, виды микроорганизмов, метагеномное секвенирование.

Источник финансирования. Работа выполнена в рамках договора № 0373100122119000041 по проекту «Создание банка биообразцов сыворотки крови и фекалий от здоровых доноров и пациентов с ожирением, метаболическим синдромом, сахарным диабетом 2 типа, нарушением мукозального барьера желудочно-кишечного тракта с целью выявления кандидатных видонеспецифических медиаторов систем quorum sensing микробиоты человека, модулирующих эндокринную и метаболическую функцию жировой ткани».

Для цитирования: Ганенко Л.А., Волкова Н.И., Шестопалов А.В., Набока Ю.Л., Зибарев А.Л. Возможные маркеры ожирения, связанные с микробиомом кишечника. *Медицинский вестник Юга России*. 2025;16(3):67-74. DOI 10.21886/2219-8075-2025-16-3-67-74.

Potential markers of obesity linked to the gut microbiome

L.A. Ganenko¹, N.I. Volkova¹, A.V. Shestopalov², Yu.L. Naboka¹, A.L. Zibarev¹

¹Rostov State Medical University, Rostov-on-Don, Russia

²Dmitry Rogachev National Medical Research Center of Pediatric Hematology, Oncology and Immunology, Moscow, Russia

Corresponding author: Lilia A. Ganenko, ganenko.lilia@yandex.ru.

Abstract. Objective: to study the features of the content of some types of microorganisms in the colon in obese patients and healthy individuals with normal body weight using metagenomic sequencing. **Materials and methods:** a total of 265 people (44 men and 221 women, average age 47.1±4.8 years) were examined. Two clinical groups were formed: healthy individuals with normal body weight (n=129) and obese patients (n=136). The composition of the intestinal microbiome was assessed using metagenomic analysis. DNA was isolated from fecal samples and sequencing of the v3-v4 variable region of the 16S rRNA gene was performed. **Results:** statistically significant (p<0.05) differences in the quantitative and qualitative parameters of some types of microorganisms in the colon of healthy individuals without obesity and in obese patients were revealed. The number of *P. copri* was increased in obese patients. and decreased *F. prausnitzii*, *B. adolescentis* and *B. longum*. **Conclusions:** the obtained results demonstrated certain species differences in the intestinal microbiome in healthy individuals and in obese patients.

Keywords: obesity, gut microbiome, microbial species, metagenomic sequencing.

Source of funding. The work was carried out within the framework of the contract No. 0373100122119000041 for the project “Creation of a bank of blood serum and feces biosamples from healthy donors and patients with obesity, metabolic syndrome, type 2 diabetes mellitus, and impaired mucosal barrier of the gastrointestinal tract in order to identify candidate species-nonspecific mediators of human microbiota quorum sensing systems that modulate the endocrine and metabolic function of adipose tissue”.

For citation: Ganenko L.A., Volkova N.I., Shestopalov A.V., Naboka Yu.L., Zibarev A.L. Potential markers of obesity linked to the gut microbiome. *Medical Herald of the South of Russia*. 2025;16(3):67-74. DOI 10.21886/2219-8075-2025-16-3-67-74.

Введение

Ожирение — это сложное нарушение обмена веществ, вызванное различными генетическими и негенетическими факторами. Распространённость данной патологии ежегодно увеличивается. Прогнозируется, что к 2030 г. число людей с ожирением во всём мире достигнет 1,12 миллиарда [1]. Ожирение проявляется не только изменениями внешнего вида, оно также связано с нарушениями липидного и углеводного обменов, хроническим воспалением и повышенным риском неинфекционных заболеваний, в первую очередь сердечно-сосудистых, сахарного диабета 2 типа и некоторых видов рака [2]. Этиология ожирения на сегодняшний день является важным направлением исследований. Недостаточное понимание патогенеза остается серьёзным препятствием к успешному лечению данного заболевания. Глобальная эпидемия ожирения стимулировала усилия учёных по выявлению новых факторов, влияющих на энергетический баланс. Несмотря на то, что пребиотики, пробиотики и антибиотики десятилетиями использовались в качестве модуляторов роста в экспериментах на животных, только недавно внимание исследователей привлекла взаимосвязь между составом кишечного микробиома, его изменением и ожирением. Появляется всё больше доказательств того, что дисбаланс микробиома/микробиоты кишечника может быть фактором, приводящим к ожирению [3,4]. Изменения в таксономическом составе микробиома кишечника способствуют более интенсивному извлечению калорий из пищи, снижению секреции гормонов, подавляющих аппетит (глюкагоноподобный пептид 1 типа (GLP-1), PYY и лептин) и чувства насыщения, а также нарушению целостности кишечного барьера, что приводит к проникновению эндотоксинов (липополисахаридов) в кровяное русло и воспалению, что в совокупности способствует развитию ожирения [5]. В макроорганизме человека обитает около 100 триллионов штаммов микроорганизмов, включающих более 10 000 видов, которые поддерживают симбиотические отношения с макроорганизмом. У взрослого человека микробиом кишечника в основном представлен двумя филумами: 79,4% *Bacillota* и 16,9% *Bacteroidota*, а также небольшим количеством *Actinomycetota* (2,5%), *Pseudomonadota* (1%) и *Verrucomicrobiota* (0,1%) бактерий [6]. Это эволюционное мутуалистическое партнёрство между макроорганизмом и микробиомом обеспечивает подавление условно-патогенных микроорганизмов, поддержание целостности эпителия кишечника, регуляцию иммунной функции, а также влияет на метаболизм макроорганизма путём выработки метаболически активных веществ, таких как короткоцепочечные жирные кислоты, метаболиты желчных кислот и различных витаминов [7]. Есть данные о том, что изменение разнообразия микробиома кишечника и количества определенных микробных таксонов связано с ожирением и метаболическими нарушениями. В настоящее время не обнаружено универсального микроорганизма, приводящего к развитию ожирения, но в различных исследованиях наблюдались ассоциации индекса массы тела (ИМТ) с некоторыми видами бактерий, включая *E.coli*, *A.muciniphila*, *F.prausnitzii* и *L.reuteri* и др. Так, для *E.coli* выявлена обратная связь с ожирением, а для *L.reuteri* — положительная, в то время как *F.prausnitzii* и

A.muciniphila менее распространены у пациентов с ожирением [8,9]. Однако результаты большинства исследований по изучению взаимосвязи микробиома кишечника с ожирением разнонаправлены и противоречивы. Но, несмотря на это, большинство исследователей, занимающихся данной проблемой, приходят к консенсусу о перспективах использования микробиома кишечника в качестве терапевтической мишени для лечения ожирения. Таким образом, дальнейшее изучение взаимосвязи между конкретными бактериями и ожирением, может быть использовано для профилактики и лечения данного заболевания в будущем.

Цель исследования — изучить особенности таксономического состава микробиома кишечника на уровне некоторых бактериальных видов у пациентов с ожирением и у здоровых людей с нормальной массой тела.

Материалы и методы

Когортное исследование проведено на базе ФГБОУ ВО РостГМУ МЗ РФ, ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» и Центра цифровой и трансляционной биомедицины ООО «Центр молекулярного здоровья», одобрено ЛНЭК ФГБОУ ВО РостГМУ (протокол № 20/19 от 12.12.2019). С целью уменьшения воздействия климатических, этнографических факторов и особенностей пищевого рациона на микробиоту кишечника в работу были включены жители одной территории (Ростовская область). В исследование вошли 265 человек (221 (83,4%) женщина, 44 (16,6%) мужчины), средний возраст обследуемых — 47,1±4,8 лет. Критерии включения: подписанное информированное согласие на участие в исследовании, ИМТ≥18,5кг/м², возраст старше 18 лет, отсутствие в анамнезе использования антибиотиков, пребиотиков и пробиотиков за 3 месяца до начала исследования. Критерии исключения: беременность, депрессия, соматические заболевания тяжёлой степени, бариатрические операции, патология желудочно-кишечного тракта. В первую (контрольную) группу были включены 129 человек: 114 (88,3%) женщин, 15 (11,6%) мужчин, средний возраст обследуемых — 39,6±4,2 года, средний показатель ИМТ — 20,8±2,1 кг/м², ОТ — 74±5,8 см. Во вторую группу вошли 136 пациентов с ожирением: 28 (20,6%) мужчин, 108 (79,4%) женщин, средний возраст — 54,6±4,7 года, среднее значение ИМТ — 33,8±3,36 кг/м², ОТ — 99,7±7,3 см. Все вошедшие в исследование были осмотрены, у них собрали жалобы и анамнез, а также определены рост, масса тела и окружность талии (ОТ). ИМТ рассчитывали по рекомендациям экспертов ВОЗ (2003). Значение окружности талии определяли сантиметровой лентой на уровне середины расстояния между рёберными дугами и гребнями подвздошных костей. Ручным тонометром по стандартной методике Н.С. Короткова выполняли измерение артериального давления. Определение состояния углеводного обмена включало исследование глюкозы плазмы натощак (ГПН), иммунореактивного инсулина и расчёт индекса инсулинорезистентности (глюкоза натощак (ммоль/л) × инсулин натощак (Ед/л)/22,5). С целью исключения дислипидемии всем обследуемым определялся уровень холестерина липопротеидов низкой (ХС ЛПНП), липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП) и общего холестерина (ОХС), а также триглицеридов

Таблица / Table 1

Клинико-лабораторные показатели обследуемых I и II групп
Clinical and laboratory parameters of subjects of groups I and II

Показатели <i>Descriptor</i>	Группа / <i>Group I (n=129)</i>	Группа / <i>Group II (n=136)</i>	P
Возраст, лет <i>Age</i>	39,6±4,2	49,8±3,9	<0,001
Индекс массы тела, кг/м ² <i>BMI</i>	19,8 [18,4;22]	33,8 [31;36]	<0,0001
Окружность талии (ж), см <i>WC</i>	73 [68;74,5]	90 [96;105]	<0,0001
Окружность талии (м), см <i>WC</i>	91 [86; 92,5]	102 [98;107]	<0,006
САД, мм рт. ст. <i>SBP</i>	100 [90;115]	130 [120;145]	<0,0001
ДАД, мм рт. ст. <i>DBP</i>	65 [60;70]	80 [75;90]	<0,0001
ГПН, ммоль/л <i>FPG, mmol/l</i>	5,06 [4,25; 5,2]	5,66 [5,04;7,29]	0,007
НОМА – IR	1,86 [1,47;2,82]	11,7 [5,08;19,3]	0,001
ОХС, ммоль/л <i>Total-C, mmol/l</i>	4,63 [4,41;5,81]	5,42 [4,56;6,23]	0,40
ХС ЛПНП, ммоль/л <i>LDL-C, mmol/l</i>	2,7 [2,3; 3,01]	3,18 [2,39;3,73]	0,20
ХС ЛПВП, ммоль/л <i>HDL-C mmol/l</i>	1,94 [1,5; 2,34]	1,29 [1,15;1,44]	0,05
ТГ, ммоль/л <i>TAG, mmol/l</i>	0,83 [0,47;1,23]	1,61 [1,25;2,5]	0,02
Инсулин, пг/мл <i>Insulin</i>	262 [133,6;418,2]	390 [170,02;678,78]	0,001

Примечание: САД — систолическое артериальное давление, ДАД — диастолическое артериальное давление, ГПН — глюкоза плазмы натощак, НОМА-IR — индекс инсулинорезистентности, ОХС — общий холестерин, ХС ЛПНП — липопротеины высокой плотности, ХС ЛПВП — липопротеины высокой плотности, ТГ — триглицериды.

Note: BMI — body mass index, WC — waist circumference, SBP — systolic blood pressure, DBP — diastolic blood pressure, FPG — fasting plasma glucose, НОМА — insulin resistance index, Total-C — total cholesterol, LDL-C — high-density lipoprotein, HDL-C — high-density lipoprotein, TAG — triglycerides.

(ТГ) в сыворотке крови. Уровень инсулина исследовался на анализаторе «Mag pix» («BioRad») с использованием набора «Milli plex: Human Adipokine Magnetic Bead Panel 2». На спектрофотометре «Hitachi U-2900» с наборами реагентов «Ольвекс Диагностикум» проводили биохимические исследования. Образцы фекалий получали согласно рекомендациям¹. Композиционный состав кишечного микробиома выполняли в условиях Междисциплинарного центра коллективного пользования КФУ путем метагеномного анализа. Из образцов фекалий ДНК макроорганизмов выделяли с использованием набора «QIAamp DNA stool mini kit» («Qiagen»). На платформе «Illumina MiSeq» проводили секвенирование

вариабельного участка v3–v4 гена 16S рРНК. Программой «QIIME v.1.9.1» с использованием референсной базы данных «Greengenes v.13.8» с 97%-ным порогом сходства между последовательностями были проанализированы выявленные последовательности генов 16S рРНК. Относительная представленность бактериальных таксонов в общем пуле ридов указана в долях (от 0 до 1), которые были рассчитаны на основе количества картированных ридов для каждого таксона. В R-версии программы «RStudio v.3.2» выполняли статистические расчеты. С помощью теста Шапиро-Уилка проведена проверка данных на нормальность распределения. Для количественных показателей рассчитаны средние ± средние квадратические отклонения; медиана и квартили (25%, 75%), минимальные и максимальные значения в выборке. Сравнение средних уровней в группах проводилось с помощью теста Манна-Уитни, частот (%) — с помощью точного теста Фишера. Сравнение частот обнаружения микроорганизмов, верифицированных в толстой кишке, в группах

1 Методики клинических лабораторных исследований: справочное пособие: в 3 т. Т. 3: Клиническая микробиология. Бактериологические исследования. Микологические исследования. Паразитологические исследования. Инфекционная иммунодиагностика. Молекулярные исследования в диагностике инфекционных заболеваний / под ред. В.В. Миньшикова. – Москва: Лабора, 2009

Рисунок 1. Частоты обнаружения отдельных видов бактерий в кишечнике у обследуемых I и II групп.
Figure 1. Frequencies of detection of individual types of bacteria in the intestines of subjects in groups I and II.

Примечание: * $p > 0,05$; сравнение частот осуществлялось с помощью точного теста Фишера, «-» — нет вариаций для вычисления p .

Note: * $p > 0,05$; frequency comparisons were performed using Fisher's exact test, "-" — no variations for p calculation.

проводилось с помощью точного теста Фишера с поправкой на множественные сравнения по Холму. Сравнение медиан количественных характеристик изучаемых микроорганизмов, верифицированных в толстой кишке, в группах проведено с помощью теста Крускала-Уоллиса (попарные апостериорные сравнения — по методу Немени). При $p < 0,05$ различия признавали статистически значимыми. Работа написана по материалам диссертации «Фенотипы ожирения и их связь с микробиомом кишечника и эндокринной функцией жировой ткани»

Результаты

Обследованные ($n=265$) были разделены на две группы: I группа ($n=129$) — контрольная, II группа ($n=136$) — пациенты с ожирением. Средний возраст лиц контрольной группы был значимо меньше ($p < 0,05$) аналогичного показателя у пациентов с ожирением. Между группами статистически значимые различия выявлены для ОТ, ИМТ и артериального давления с повышением их значений во II группе. Помимо этого, у пациентов с ожирением уровень ГПН, инсулина, индекса НОМА-IR и значение ТГ были выше ($p=0,007$, $p=0,001$, $p=0,001$, $p=0,02$ соответственно) по сравнению со здоровыми лицами. При этом во II группе уровень ХС ЛПВП был ниже по сравнению с обследуемыми контрольной группы. По уровню ОХС ($p=0,40$) и ХС ЛПНП ($p=0,20$) обе группы были сопоставимы. Сравнение клинико-лабораторных показателей пациентов I и II групп представлено в таблице. 1.

При сравнении частот обнаружения отдельных видов микроорганизмов (рис. 1) выявлено, что *Faecalibacterium prausnitzii* регистрировали у 100,0% обследуемых обеих

групп. Также в микробиоме кишечника преобладали такие виды, как *Prevotella copri* (98,0% в I группе, 100,0% во II группе), *Bifidobacterium adolescentis* (92,0% в I группе, 97,0% во II группе) и *Akkermansia muciniphila* (79,0% в I группе, 84,0% во II группе). Частоты обнаружения *Lactobacillus reuteri* ($p=0,04$) и *Lactobacillus ruminis* ($p=0,04$) статистически значимо были повышены у пациентов с ожирением.

Анализ количественных показателей (табл. 2) выявил значимые отличия для 4 видов микроорганизмов, а именно: для *F. prausnitzii*, *P. copri*, *B. adolescentis*, *B. longum*. У пациентов с ожирением в кишечном микробиоме были снижены показатели у *F. prausnitzii* ($p=0,02$), *B. adolescentis* ($p=0,002$) и *B. longum* ($p < 0,0001$), но повышены у *P. copri* ($p=0,02$).

Таким образом, полученные результаты продемонстрировали определённые видовые отличия в микробиоме кишечника у здоровых лиц и у пациентов с ожирением.

Обсуждение

При анализе отдельных видов микроорганизмов у здоровых лиц и пациентов с ожирением во всех случаях в микробиоме кишечника были обнаружены *F. prausnitzii*, также преобладали виды *A. muciniphila*, *B. adolescentis* и *P. copri*. Были выявлены качественные и количественные различия отдельных видовых паттернов бактерий в обследуемых группах. Так, по признаку частот обнаружения значимые отличия выявлены для *L. reuteri* и *L. ruminis*, которые чаще регистрировали у пациентов с ожирением. Что согласуется с результатами других исследователей [10]. Анализ количественных показателей

Таблица / Table 2

Количественные показатели отдельных видов бактерий в кишечнике у обследуемых I и II групп
Quantitative indicators of individual types of bacteria in the intestines of subjects of groups I and II

Микроорганизмы Microorganisms	Количественные показатели Quantitative indicators		
	Группа / Group I (n=129)	Группа / Group II (n=136)	P
<i>F. prausnitzii</i>	0,075 [0,057; 0,11]	0,067 [0,044; 0,099]	0,02
<i>P. copri</i>	0,027 [0,0019; 0,17]	0,03 [0,0053; 0,24]	0,02
<i>A. muciniphila</i>	0,0013 [0,00021; 0,0059]	0,00059[0,0002; 0,0083]	0,9
<i>B. adolescentis</i>	0,0026 [0,00082; 0,012]	0,0013[0,00053; 0,0032]	0,002
<i>B. longum</i>	0,0024 [0,0005; 0,01]	0,00055[0,00023; 0,002]	<0,0001
<i>B. pseudolongum</i>	0,000073[0,00007; 0,0012]	0,000076[0,00007; 0,00041]	1,0
<i>B. bifidum</i>	0,000069[0,000069; 0,000071]	0,00072[0,000071; 0,000074]	0,4
<i>L. ruminis</i>	0,00021[0,000072; 0,00048]	0,00014[0,000071; 0,00035]	0,9
<i>L. zeae</i>	0,00014[0,00007; 0,00029]	0,00014[0,00007; 0,00048]	0,7
<i>L. mucosae</i>	0,000071[0,00007; 0,0002]	0,000072[0,000071; 0,000074]	1,0
<i>L. brevis</i>	0,00014[0,000069; 0,00021]	0	-
<i>L. reuteri</i>	0,000074[0,000071; 0,056]	0,00027[0,000069; 0,00035]	0,9
<i>L. iners</i>	0,00015[0,000067; 0,00033]	0	-
<i>L. agilis</i>	0,00015[0,00015; 0,00015]	0	-
<i>L. manihotivorans</i>	0,00014[0,00014; 0,00014]	0,00014[0,00014; 0,00014]	1,0
<i>E. coli</i>	0,0001[0,000069; 0,00014]	0,00011[0,000069; 0,00021]	0,8

Примечание: сравнение количественных показателей осуществлялось с помощью теста Манна-Уитни.

Note: comparison of quantitative indicators was performed using the Mann-Whitney test.

показал значимые отличия для 4 видов (*B. adolescentis*, *B. longum*, *P. copri*, *F. prausnitzii*). У пациентов с ожирением в микробиоме кишечника были снижены *B. adolescentis* ($p=0,002$), *B. longum* ($p<0,0001$), *F. prausnitzii* ($p=0,02$) и повышены *P. copri* ($p=0,02$) по сравнению с аналогичными показателями обследуемых контрольной группы. По данным литературы, *F. prausnitzii* (филум *Bacillota*) оказывает противовоспалительное действие на желудочно-кишечный тракт путем продукции бутирата и подавления уровня провоспалительных цитокинов, поэтому уменьшение количества данного вида бактерий в микробиоме кишечника может быть опосредованно связано с состоянием ожирения [11, 12]. Более низкое содержание *F. prausnitzii* в микробиоме кишечника пациентов с ожирением, обнаруженное в данной работе, согласуется с результатами других авторов [13, 14]. Однако есть исследования, которые не выявили разницы в содержании *F. prausnitzii* при ожирении и нормальной массе тела [15]. Более низкий уровень *B. adolescentis* и *B. longum*, относящихся к филуму *Bacillota*, у пациентов с ожирением также был описан некоторыми исследователями [16]. В частности, Torres-Fuentes C. et al. предположили, что основные механизмы влияния бифидобактерий на снижение массы тела человека могут быть связаны с уменьшением содержания орексигенного гормона грелина, поскольку было обнаружено, что *B. longum* ослабляет грелинергическую передачу сигналов *in vitro* [17]. Противоположные результаты были получены в отношении количества *P. copri*, уровень которого в нашем исследовании у пациентов с ожирением был статистически значимо выше по

сравнению со здоровыми лицами без ожирения, что также было обнаружено и в других работах [18]. Есть данные, что транскриптоны толстой кишки, жировой ткани и мышц у мышей, колонизированных *P. copri*, сопровождалась активацией хронической воспалительной реакции макроорганизма через сигнальные пути TLR4 и mTOR и значительным увеличением экспрессии генов, связанных с липогенезом и накоплением жира, но ослаблением экспрессии генов, связанных с липолизом [10, 19]. В нашем исследовании отсутствовали статистически значимые различия в содержании *A. muciniphila* у пациентов с ожирением и у здоровых лиц без ожирения. При этом большинство имеющихся на сегодняшний день данных выявило обратную корреляцию между уровнем *A. muciniphila* и ИМТ [20]. Механизмы, с помощью которых *A. muciniphila* может влиять на массу тела, полностью не изучены. *A. muciniphila* — муциндеградирующая бактерия, относится к филуму *Verrucomicrobiota*, обеспечивая целостность кишечного барьера и сохранения таксономического состава микробиома кишечника в состоянии эубиоза, что способствует удержанию нормальной массы тела [21]. Также есть данные, что *A. muciniphila* способна усиливать термогенез и секрецию глюкагоноподобного пептида-1 и снижать экспрессию белков, участвующих в дифференцировке адипоцитов, а также экспрессию генов переносчиков глюкозы и фруктозы в тощей кишке, тем самым снижая всасывание углеводов [22, 23]. Помимо этого, в одном из исследований было выявлено, что у пациентов, перенесших бариатрическую операцию (шунтирование желудка по методу Ру-эн-У) наблюдалось

увеличение количества *A. muciniphila* наряду с улучшением антропометрических и клинических показателей, таких как снижение ИМТ, а также повышение уровня GLP-1 [20].

Увеличение количества лактобактерий, относящихся к филуму *Bacillota*, обычно, связывают с ожирением [24]. Среди бактерий этого рода *Lactobacillus reuteri* [5] коррелирует с более высоким ИМТ, что было выявлено и в нашем исследовании. Однако некоторые виды лактобактерий (*Lactobacillus paracasei* и *Lactobacillus plantarum*), наоборот, способствуют снижению массы тела благодаря выработки бактериоцинов, которые препятствуют росту патогенов, вызывающих дисбиоз [25]. Эти данные свидетельствуют о том, что бактерии даже одного и того же вида могут оказывать противоположные эффекты на энергетический гомеостаз. Многочисленные исследования, в которых сравнивался микробиом кишечника у пациентов с ожирением и у здоровых лиц, выявили значительные изменения в его составе не только на уровне отдельных видов бактерий, но и на уровне филумов. При ожирении, по данным большинства исследований, наблюдается уменьшение количества бактерий типа *Bacteroidota* и увеличение количества бактерий типа *Bacillota* [10]. Так, соотношение *Bacillota/Bacteroidota* было значительно выше в группе с ожирением и более чем в два раза превышало значение в группе обследуемых без ожирения. Однако другие авторы выявили обратную зависимость, то есть более низкий уровень *Bacteroidota* и более высокий — *Actinomycetota* без существенной разницы в *Bacillota* у пациентов с ожирением [26], в то время как в других исследованиях не удалось выявить корреляцию между ИМТ и соотношением *Bacillota/Bacteroidota* [27]. Считается, что повышенное соотношение *Bacillota/Bacteroidota* у людей с ожирением приводит к более эффективному гидролизу углеводов в кишечнике и увеличению количества получаемых калорий из продуктов питания [28]. По результатам нашего исследования, у пациентов с ожирением для филума *Bacteroidota* регистрировали

статистически значимо более высокий уровень ($p < 0,05$), а для *Bacillota* и *Actinomycetota* — более низкий ($p < 0,05$) [29]. Наличие расхождений в результатах проведенных исследований может быть вызвано множеством факторов, такими как методы, используемые для анализа микробиома кишечника, разной конструкцией праймеров и разными методами выделения ДНК отличаться характеристиками исследуемой популяции (особенности пищевого рациона, пол, географическое расположение, этническая принадлежность и сезон). Поскольку микробиом кишечника подвержен влиянию различных факторов внешней и внутренней среды и трудно контролировать все элементы, влияющие на его состав, что, безусловно, усложняет изучение микробиома кишечника при ожирении. Тем не менее, результаты большинства исследований, нашего в том числе, показывают, что при ожирении формируется особый состав микробиома кишечника, отличный от микробиома здоровых лиц без ожирения.

Закключение

Эффективное лечение ожирения по-прежнему остается важной социальной и медицинской потребностью. Имеющиеся на сегодняшний день данные подтверждают предположение о том, что микробиом кишечника является ещё одним важным фактором в и без того в сложном и длинном списке причин, влияющих на развитие ожирения. На данный момент общепризнанным является тот факт, что ожирение не вызывается каким-то одним видом бактерий, но определяется нарушением экологического баланса микробиома кишечника. Однако степень влияния микробиома кишечника на увеличение массы тела у людей до сих пор не определена, что требует дальнейшего изучения. Результаты данного исследования свидетельствуют о том, что в микробиоме кишечника при ожирении наблюдаются некоторые видовые отличия, что связано с повышенным уровнем *P. coprii* и сниженным уровнем *F. prausnitzii*, *B. adolescentis* и *B. longum*.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES

1. Liu BN, Liu XT, Liang ZH, Wang JH. Gut microbiota in obesity. *World J Gastroenterol*. 2021;27(25):3837-3850. <https://doi.org/10.3748/wjg.v27.i25.3837>
2. Fishman B, Zloof Y, Orr O, Tsur AM, Furer A, et al. The opposing trends of body mass index and blood pressure during 1977-2020; nationwide registry of 2.8 million male and female adolescents. *Cardiovasc Diabetol*. 2021;20(1):242. <https://doi.org/10.1186/s12933-021-01433-0>
3. Mishra S, Jain S, Agadzi B, Yadav H. A Cascade of Microbiota-Leaky Gut-Inflammation- Is it a Key Player in Metabolic Disorders? *Curr Obes Rep*. 2025;14(1):32. <https://doi.org/10.1007/s13679-025-00624-0>
4. Aron-Wisnewsky J, Warmbrunn MV, Nieuwdorp M, Clément K. Metabolism and Metabolic Disorders and the Microbiome: The Intestinal Microbiota Associated With Obesity, Lipid Metabolism, and Metabolic Health-Pathophysiology and Therapeutic Strategies. *Gastroenterology*. 2021;160(2):573-599. <https://doi.org/10.1053/j.gastro.2020.10.057>
5. Crovesy L, Masterson D, Rosado EL. Profile of the gut microbiota of adults with obesity: a systematic review. *Eur J Clin Nutr*. 2020;74(9):1251-1262. <https://doi.org/10.1038/s41430-020-0607-6>
6. Iacob S, Iacob DG, Luminos LM. Intestinal Microbiota as a Host Defense Mechanism to Infectious Threats. *Front Microbiol*. 2019;9:3328. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2018.03328>
7. Cheng Z, Zhang L, Yang L, Chu H. The critical role of gut microbiota in obesity. *Front Endocrinol (Lausanne)*. 2022;13:1025706. <https://doi.org/10.3389/fendo.2022.1025706>
8. Kobylak N, Falalyeyeva T, Kyriachenko Y, Tseyslyer Y, Kovalchuk O, et al. Akkermansia muciniphila as a novel powerful bacterial player in the treatment of metabolic disorders. *Minerva Endocrinol (Torino)*. 2022;47(2):242-252. <https://doi.org/10.23736/S2724-6507.22.03752-6>
9. Ussar S, Fujisaka S, Kahn CR. Interactions between host genetics and gut microbiome in diabetes and metabolic syndrome. *Mol Metab*. 2016;5(9):795-803. <https://doi.org/10.1016/j.molmet.2016.07.004>
10. Brandão I, Martins MJ, Monteiro R. Metabolically Healthy Obesity-Heterogeneity in Definitions and Unconventional Factors. *Metabolites*. 2020;10(2):48.

- <https://doi.org/10.3390/metabo10020048>
11. Biondi G, Marrano N, Borrelli A, Rella M, Palma G, et al. Adipose Tissue Secretion Pattern Influences β -Cell Wellness in the Transition from Obesity to Type 2 Diabetes. *Int J Mol Sci.* 2022;23(10):5522. <https://doi.org/10.3390/ijms23105522>
 12. Blüher M. Metabolically Healthy Obesity. *Endocr Rev.* 2020;41(3):bnaa004. <https://doi.org/10.1210/edrv/bnaa004>
 13. Bakir-Gungor B, Bulut O, Jabeer A, Nalbantoglu OU, Yousef M. Discovering Potential Taxonomic Biomarkers of Type 2 Diabetes From Human Gut Microbiota via Different Feature Selection Methods. *Front Microbiol.* 2021;12:628426. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2021.628426>
 14. Ronan V, Yeasin R, Claud EC. Childhood Development and the Microbiome-The Intestinal Microbiota in Maintenance of Health and Development of Disease During Childhood Development. *Gastroenterology.* 2021;160(2):495-506. <https://doi.org/10.1053/j.gastro.2020.08.065>
 15. Feng J, Tang H, Li M, Pang X, Wang L, Zhang M, Zhao Y, Zhang X, Shen J. The abundance of fecal *Faecalibacterium prausnitzii* in relation to obesity and gender in Chinese adults. *Arch Microbiol.* 2014;196(1):73-77. <https://doi.org/10.1007/s00203-013-0942-2>
 16. Stephens RW, Arhire L, Covasa M. Gut Microbiota: From Microorganisms to Metabolic Organ Influencing Obesity. *Obesity (Silver Spring).* 2018;26(5):801-809. <https://doi.org/10.1002/oby.22179>
 17. Schellekens H, Torres-Fuentes C, van de Wouw M, Long-Smith CM, Mitchell A, et al. *Bifidobacterium longum* counters the effects of obesity: Partial successful translation from rodent to human. *EBioMedicine.* 2021;63:103176. <https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2020.103176>
 18. Stanislawski MA, Dabelea D, Lange LA, Wagner BD, Lozupone CA. Gut microbiota phenotypes of obesity. *NPJ Biofilms Microbiomes.* 2019;5(1):18. <https://doi.org/10.1038/s41522-019-0091-8>
 19. Chen C, Fang S, Wei H, He M, Fu H, et al. *Prevotella copri* increases fat accumulation in pigs fed with formula diets. *Microbiome.* 2021;9(1):175. <https://doi.org/10.1186/s40168-021-01110-0>
 20. Rodrigues VF, Elias-Oliveira J, Pereira ÍS, Pereira JA, Barbosa SC, et al. *Akkermansia muciniphila* and Gut Immune System: A Good Friendship That Attenuates Inflammatory Bowel Disease, Obesity, and Diabetes. *Front Immunol.* 2022;13:934695. <https://doi.org/10.3389/fimmu.2022.934695>
 21. Cani PD, Van Hul M. Gut microbiota in overweight and obesity: crosstalk with adipose tissue. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol.* 2024;21(3):164-183. <https://doi.org/10.1038/s41575-023-00867-z>
 22. Yoon HS, Cho CH, Yun MS, Jang SJ, You HJ, Kim JH, Han D, Cha KH, Moon SH, Lee K, Kim YJ, Lee SJ, Nam TW, Ko G. *Akkermansia muciniphila* secretes a glucagon-like peptide-1-inducing protein that improves glucose homeostasis and ameliorates metabolic disease in mice. *Nat Microbiol.* 2021;6(5):563-573. <https://doi.org/10.1038/s41564-021-00880-5>
 23. Lee JS, Song WS, Lim JW, Choi TR, Jo SH, et al. An integrative multiomics approach to characterize anti-adipogenic and anti-lipogenic effects of *Akkermansia muciniphila* in adipocytes. *Biotechnol J.* 2022;17(2):e2100397. <https://doi.org/10.1002/biot.202100397>
 24. Martemucci G, Khalil M, Di Luca A, Abdallah H, D'Alessandro AG. Comprehensive Strategies for Metabolic Syndrome: How Nutrition, Dietary Polyphenols, Physical Activity, and Lifestyle Modifications Address Diabetes, Cardiovascular Diseases, and Neurodegenerative Conditions. *Metabolites.* 2024;14(6):327. <https://doi.org/10.3390/metabo14060327>
 25. Million M, Maraninchi M, Henry M, Armougom F, Richet H, et al. Obesity-associated gut microbiota is enriched in *Lactobacillus reuteri* and depleted in *Bifidobacterium animalis* and *Methanobrevibacter smithii*. *Int J Obes (Lond).* 2012;36(6):817-25. Retraction in: *Int J Obes (Lond).* 2024;48(10):1516. <https://doi.org/10.1038/ijo.2011.153>
 26. Hur HJ, Wu X, Yang HJ, Kim MJ, Lee KH, et al. Beneficial Effects of a Low-Glycemic Diet on Serum Metabolites and Gut Microbiota in Obese Women With *Prevotella* and *Bacteriodes* Enterotypes: A Randomized Clinical Trial. *Front Nutr.* 2022;9:861880. <https://doi.org/10.3389/fnut.2022.861880>
 27. Muheyati D, Han J, Lv M, Jielili M, Jing Z, et al. Composition of gut microbiota in obese and normal-weight Uyghur adults and its association with adipocyte-related factors. *Sci Rep.* 2024;14(1):24649. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-76351-8>
 28. Palmas V, Pisanu S, Madau V, Casula E, Deledda A, et al. Gut microbiota markers associated with obesity and overweight in Italian adults. *Sci Rep.* 2021;11(1):5532. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-84928-w>
 29. Гапонов А.М., Волкова Н.И., Ганенко Л.А., Набока Ю.Л., Маркелова М.И., и др. Особенности микробиома толстой кишки у пациентов с ожирением при его различных фенотипах (оригинальная статья). *Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии.* 2021;98(2):144-155. <https://doi.org/10.36233/0372-9311-66>

Информация об авторах

Ганенко Лилия Александровна, к.м.н., доцент кафедры внутренних болезней №3, Ростовский государственный медицинский университет, Ростов-на-Дону, Россия, <https://orcid.org/0000-0002-3381-9894>; ganenko.lilia@yandex.ru

Волкова Наталья Ивановна, д.м.н., проф., заведующая кафедрой внутренних болезней №3, Ростовский государственный медицинский университет, Ростов-на-Дону, Россия, <https://orcid.org/0000-0003-4874-7835>; n_i_volkova@mail.ru

Александр Вячеславович Шестопалов, д.м.н., проф.,

Information about the authors

Lilia A. Ganenko, Cand. Sci. (Med.), Associate Professor of the Department of Internal Medicine N 3, Rostov State Medical University, Rostov-on-Don, Russia; <https://orcid.org/0000-0002-3381-9894>; ganenko.lilia@yandex.ru

Natalya I. Volkova, Dr. Sci. (Med.), Professor, Head of Department of internal diseases No3, Rostov State Medical University, Rostov-on-Don, Russia; <https://orcid.org/0000-0003-4874-7835>; n_i_volkova@mail.ru

Alexander V. Shestopalov, D. Sci. (Med.), Professor, Deputy director, Center of Digital and Translational Biomedicine, Center for Molecular Health, Moscow, Russia; Director,

зам. директора Центра цифровой и трансляционной биомедицины «Центр молекулярного здоровья», Москва, Россия; директор управления последипломного образования, ординатуры, аспирантуры НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, Москва, Россия; <https://orcid.org/0000-0002-1428-7706>; al-shest@yandex.ru.

Набока Юлия Лазаревна, д.м.н., проф., заведующая кафедрой микробиологии и вирусологии №1, Ростовский государственный медицинский университет, Ростов-на-Дону, Россия, <https://orcid.org/0000-0002-0937-4573>; nagu22@mail.ru.

Зибарев Александр Леонидович, ассистент кафедры внутренних болезней №3, Ростовский государственный медицинский университет, Ростов-на-Дону, Россия, <https://orcid.org/0009-0003-8219-395X>; zibarev_al@mail.ru.

Вклад авторов

А.В. Шестопалов, Н.И. Волкова — разработка дизайна исследования;

Л.А. Ганенко — получение и анализ данных, написание текста рукописи;

Ю.Л. Набока — редактирование статьи и ее окончательное утверждение;

А.Л. Зибарев — обзор публикаций по теме статьи, редактирование статьи.

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Department of postgraduate education, residency, postgraduate studies, Dmitry Rogachev National Medical Research Center of Pediatric Hematology, Oncology and Immunology, Moscow, Russia, Head, Department of biochemistry and molecular biology, Medical faculty, N.I. Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow, Russia, <https://orcid.org/0000-0002-1428-7706>; al-shest@yandex.ru.

Yulia L. Naboka, D. Sci. (Med.), Professor, Head, Department of microbiology and virology N 1, Rostov State Medical University, Rostov-on-Don, Russia, <https://orcid.org/0000-0002-0937-4573>; nagu22@mail.ru.

Alexander L. Zibarev, Assistant Professor of the Department of Internal Medicine N 3, Rostov State Medical University, Rostov-on-Don, Russia; <https://orcid.org/0009-0003-8219-395X>; zibarev_al@mail.ru.

Authors' contribution

A.V. Shestopalov N. I. Volkova — research design development;

L.A. Ganenko — obtaining and analysis of the data, writing the text of the manuscript;

Yu.L. Naboka — editing the article and its final approval;

A.L. Zibarev — review of publications on the topic of the article, editing the article.

Conflict of interest

Authors declares no conflict of interest.

Поступила в редакцию / *Received*: 05.04.2025

Принята к публикации / *Accepted*: 26.06.2025